



بنام خداوند جان و خرد  
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا  
بخش آموزش به بیمار

# راهنمای مصرف آسپرین (Aspirin)



آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: ۳۶۴۹۰۴۱۱-۱۷

فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	راهنمای مصرف آسپرین
تهیه کننده	مریم جریده - ساره گرکانی
تأیید کننده	خانم دکتر غلام نژاد
سمت	داروساز
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۰
ناظر کیفی	م- برومند سوپروایزر ارتقاء سلامت
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان	

منابع:

داروهای ژنریک ایران

دکتر رامین خدام





در صورت بروز هر گونه علائم زیر، هر چه زودتر با پزشک تماس بگیرید:  
علائم آلرژیک: از جمله تنفس سخت، تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو.  
سایر علائم:

- ❖ زنگ زدن گوش / سردرگمی / توهم
- ❖ تنفس سریع / تشنج / تهوع و استفراغ
- ❖ درد معده / خونریزی در مدفوع / سرفه خونی

- در رابطه با مصرف آسپرین در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.
- مصرف آسپرین باید دقیقاً بر طبق دستور پزشک باشد و از مصرف خودسرانه آن خودداری فرمائید.
- در صورتی که آسپرین سبب درد معده در شما شود، بهتر است با معده خالی مصرف نشود.
- در صورتی که عمل جراحی در پیش دارید، قبل از جراحی در مورد مصرف آسپرین به پزشک اطلاع دهید.
- از مصرف الکل هنگام مصرف آسپرین جداً خودداری کنید، الکل ممکن است خطر خونریزی معده را افزایش دهد.
- مصرف همزمان آسپرین با قرص‌های مسکن از جمله ایبوپروفن توصیه نمی‌شود چون اثر آسپرین را چند برابر می‌کند.



### آسپرین چیست؟

آسپرین یا استیل سالسیلیک اسید یک داروی ضد التهاب استروئیدی و ضد پلاکت می باشد که از آن برای درمان درد و کاهش تب یا التهاب و گاهی اوقات هم برای درمان و یا جلوگیری از حملات قلبی، سکته مغزی و درد قفسه سینه ( آنژین ) مصرف می شود.

آسپرین یکی از داروهای رایج است که بسیاری از ما مصرف می کنیم، اما مصرف خودسرانه آسپرین می تواند سبب ایجاد بیماری های جدی و گاه مرگبار شود.



### لطفاً به نکات زیر توجه فرمائید:

- مصرف آسپرین در کودکان و نوجوانان با تب بالا و علائم آنفلانزا یا موارد ریسک پذیر توصیه نمی شود.
- برای اطمینان از اینکه این دارو برای شما امن است، در مورد بیماری های زیر و ابتلا به آن با پزشک مشورت کنید:  
آسم یا آلرژی فصلی / زخم معده / بیماری کبد / بیماری کلیوی / اختلال لخته شدن خون / نقرس / فشار خون.