

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

مراقبت های پس از عمل

ختنه



آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن : 36490411-17

فاکس : 36490433



شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	مراقبت های پس از عمل ختنه
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تأیید کننده	دکتر بنانی
سمت	پزشک جراح
سال تهیه	تابستان 1400
ناظر کیفی	م. برومند (سوپروایزر ارتقاء سلامت)
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع:

کتاب جراحی اطفال



تغذیه بیمار بعد از ترخیص :

1- در صورت بی حسی موضعی : غذا مانند قبل از عمل داده شود .

2- در صورت بی هوشی عمومی: غذا مایعات در حجم کمتر از حد معمول جهت رفع گرسنگی در روز اول هر 3 تا 4 ساعت داده شود .

غذا از روز دوم یعنی یک روز پس از عمل مانند قبل از عمل داده شود .

3- در صورت داشتن حالت تهوع قطره متوکلوپرامید هر شش ساعت قبل از غذا به مدت تا 2 الی 3 روز داده شود .

تعداد قطرات به ازای هر کیلو وزن بدن یک قطره هر 6 ساعت داده شود .

4- مراجعه به مطب 6 تا 7 روز پس از عمل می باشد .



5. پماد ویتامین A+D روزی دوبار در محل عمل از روز ششم به مدت پنج روز دیگر استفاده شود .



6. در صورت باز کردن مجاری ادرار (عمل ماتاتومی) روزی

دوبار با درجه زیر زبانی پماد درون مجرا مالیده شود .

7. نظافت مقعد با گاز مرطوب تا سه روز پس از عمل (جهت پیشگیری از آلوده شدن زخم با میکروب مدفوع

8. استفاده از لگن آبگرم روزی دوبار به مدت 5 دقیقه از روز چهارم الی ششم



9. به مدت سه روز از قنذاق نمودن و یا پوشک ترجیحاً استفاده نشود. چون ممکن است زخم با مدفوع آلوده شود.

انجام اقدامات دارویی بعد از ترخیص :

1. کودکان کمتر از 5 ماه ، قطره استامینوفن هر 6 ساعت (4قطره به ازای هر کیلو وزن بدن) داده شود .



2. کودکان بالاتر از 6 ماه ، شربت استامینوفن 0.5cc به ازای هر کیلو وزن بدن، هر 6 ساعت داده شود .



3. شربت هیدروکسی زین در صورت بی قراری ،

0.5cc به ازای هر کیلو وزن بدن روزی دو الی سه بار داده شود.



4. پماد ضد میکروب (جنتامایسین و یا موپیروسین) روزی دو بار در محل عمل به مدت پنج روز مالیده شود .

