



بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

راهنمای مصرف ریواروکسابان

(آکساین، زالربان، ...)



آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: ۱۷-۰۴۱۱-۳۶۴۹۰

فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳



عوارض ناخواسته دارویی ریواروکسابان:

۱. در صورت مشاهده هر گونه علائم خونریزی (استفراغ خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع یا خلط، خونریزی لثه، خونریزی غیر طبیعی واژینال، کبودی و کوفتگی بی دلیل در پوست و ...) حتماً به پزشک مراجعه کنید و درمانگر خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

۲. چنانچه احساس تهوع، سوء هاضمه و درد معده نمودید، از مصرف غذاهای پر چرب و پر ادویه خودداری نمایید و حتماً دارو را بعد از غذا میل کنید.

۳. در صورت احساس سرگیجه، خستگی یا از حال رفتن، از رانندگی و کار با ابزاری که نیاز به تمرکز دارند، خودداری کنید.

۴. آزمایشات خون دوره ای که برای شما تجویز میگردد، جهت بررسی تغییرات فاکتورهای انعقاد خون در روند درمان لازم است.

۵. در صورت مشاهده تغییرات غیر طبیعی مثل افزایش درجه حرارت بدن، ورم در ناحیه پا یا مچ، بروز لکه های قرمز پوستی و خارش، با پزشک خود مشورت کنید.



شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	راهنمای مصرف ریواروکسابان (آکساین، زالربان، ...)
تهیه کننده	ساره گرکانی - پرستار
تأیید کننده	خانم دکتر غلام نژاد
سمت	داروساز
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۰
ناظر کیفی	م- برومند سوپروایزر ارتقاء سلامت
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان	

منابع:

داروهای ژنریک ایران

دکتر رامین خدام



- در صورت اختلال کبدی یا کلیوی، پزشک خود را در جریان قرار دهید.

- لیست کاملی از داروهای مصرفی خود را در اختیار پزشک یا داروساز قرار دهید تا در صورت احتمال بروز تداخل دارویی، اقدامات لازم صورت گیرد.

- چنانچه به این دارو یا داروهای مشابه، حساسیت دارید حتما پزشک را در جریان قرار دهید.

نحوه صحیح مصرف ریواروکسابان :

- ریواروکسابان را دقیقا طبق تجویز پزشک به صورت منظم در روز مصرف نمایید.

- میتوانید قرص ریواروکسابان را همراه یا بعد از غذا مصرف کنید، زیرا مصرف این دارو همراه غذا، جذب آن را از طریق معده افزایش می دهد.

- سعی کنید دارو را بصورت منظم و در زمان مشخصی از روز مصرف نمایید. این کار از فراموش کردن مصرف دارو جلوگیری می کند.

- چنانچه در بلعیدن قرص ها مشکل دارید، میتوانید قرص را خرد کرده و یا در یک لیوان آب یا پوره ی سیب حل نمایید.

- در صورت فراموشی یک نوبت مصرف آسکابین، به محض یادآوری دارو را مصرف نمایید. از ۲ برابر نمودن مقدار مصرف در یک نوبت خودداری کنید.

- در صورتیکه نیاز به جراحی دندان دارید، حتما درمانگر خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.



ویژگی های ریواروکسابان (آسکابین، زالبران، ...):

- آسکابین جهت درمان لخته های عمقی وریدی (DVT) و آمبولی ریوی (وجود لخته در رگ های ریه) نیز تجویز می شود.

- این دارو همچنین به عنوان پیشگیری کننده از تشکیل لخته بعد از انجام عمل های جراحی زانو، لگن یا در برخی بیماری های قلبی مانند فیبریلاسیون دهلیزی (AF) ← نوعی ضربان نامنظم قلب) نیز تجویز می گردد.

تذکرات مهم قبل از شروع مصرف ریواروکسابان :

- در صورت بارداری یا شیردهی، پزشک خود را در جریان قرار دهید.

- در صورتی که در چند ماه اخیر اقدام به عمل جراحی نموده اید، حتما پزشک را در جریان قرار دهید.

- چنانچه سابقه زخم گوارش و فشار خون بالا دارید، به پزشک اطلاع دهید.

آشنایی با داروی ریواروکسابان (داروی ضد انعقاد)



ریواروکسابان (آسکابین، زالبران، ...) چیست؟

ریواروکسابان (آسکابین، زالبران، ...) یک داروی ضد انعقاد است که با پیشگیری از تشکیل لخته خون، از بروز انسداد عروق و عوارض ناشی از آن جلوگیری می کند.

لخته های خون می توانند در سیاهرگ های ناحیه پا، ریه، مغز یا قلب تشکیل گردند و باعث جلوگیری از خون رسانی مناسب به این نواحی شوند.

احتمال بروز تشکیل لخته در سیاهرگ های بدن در دوران نقاهت پس از جراحی ها یا در شرایطی که فرد ضریان قلب غیر طبیعی داشته باشد، افزایش می یابد.

قبل از معرفی داروی آسکابین، از سالیان پیش داروی وارفارین جهت پیشگیری از تشکیل لخته در چنین شرایطی تجویز می شده است. اما مصرف کنندگان وارفارین جهت پیشگیری از عوارض خونریزی دهنده ی این دارو، به صورت منظم و در فواصل نزدیک، آزمایش خونی مخصوصی جهت بررسی وضعیت انعقاد خون خود بدهند تا در هر زمان، مقدار مناسب وارفارین توسط پزشک برای آنها تعیین شود.

تفاوت عملکرد ریواروکسابان با وارفارین:

تفاوت این دو موجب می شود طی مصرف داروی آسکابین، نیاز به آزمایشات خونی منظمی نباشد و از این جهت نسبت به وارفارین برتری یافته است.