

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

پروستاتکتومی (برداشتن پروستات)




آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: 36490411-17


فاکس: 36490433



شکل ۱. توجه کنید که مجرای ادرار از وسط پروستات عبور می‌کند و از اطراف به مجرای ادرار فشار وارد می‌کند (فلشها).

شناسنامه بروشور آموزشی	
پروستاتکتومی (برداشتن پروستات)	عنوان
دکتر خورشیدی	تهیه کننده
پزشک جراح	سمت
م. برومند (سوپروایزر ارتقاء سلامت)	تأیید کننده
تابستان 1400	بازنگری
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع: اصول جراحی شوارتز 2014



مراقبت های بعد از ترخیص

- 1- ممنوعیت غذایی ندارد . مایعات فراوان بنوشد .
- 2- تعویض پانسمان روزانه .
- 3- سه روز بعد از ترخیص می تواند حمام کند .
- 4- از خوردن غذای نفاخ خودداری شود .
- 5- طبق آموزشی که به شما داده شده است. لوله شکمی طبق نظر پزشک معالج با چسب راهش بسته شود و در تاریخ تعیین شده با جواب پاتولوژی و برگ سبز خلاصه پرونده به مطب پزشک مراجعه کنید.
- 6- برای گرفتن جواب پاتولوژی پنج روز بعد با آزمایشگاه بیمارستان دنا تماس بگیرید و در صورت آماده بودن جواب با کارت زرد به آزمایشگاه مراجعه کنید.
- 7- خالی کردن کیسه ادراری
- 8- ممکن است بعد از عمل دچار بی اختیاری ادرار شوید که جای نگرانی نیست.



مراقبت های بعد از عمل

وقتی پزشک شما اجازه پایین آمدن از تخت را به شما داد. از تخت خارج شوید ، و راه بروید ، نباید به مدت طولانی بنشینید چون نشستن به مدت طولانی موجب افزایش فشار داخل شکم شده و احتمالاً ناراحتی و خونریزی به دنبال خواهد داشت . برای کمک به کار کردن شکم و پیشگیری از زور زدن هنگام دفع، نرم کننده های مدفوع به شما داده می شود.



پروستاتکتومی چیست؟

عمل جراحی برداشتن بخشی یا تمام غده پروستات است. غده پروستات گرداگرد مجرای خروجی مثانه قرار دارد. این تولید مایع که با اسپرم مخلوط میشود به شکل مایع منی آنتی ژن اختصاصی در پروستات تولید میکند، که تحرک اسپرم پس از انزال را تسهیل میدهد. پروستاتکتومی در درجه اول درمان سرطان پروستات و سرطان خوش خیم هیپرپلازی پروستات است که مجرای ادرار به حدی منقبض میشود که آن با ادرار کردن تداخل پیدا میکند . جراحی پروستات در بیماران دچار بزرگ شدن خوش خیم پروستات و سرطان پروستات انجام می شود . عمل جراحی پروستات باید قبل از بروز احتباس حاد ادرار و صدمه قسمتهای فوقانی دستگاه ادراری یا در موارد سرطان قبل از پیشرفت سرطان انجام شود.

عوارض پروستاتکتومی

عوارض پروستاتکتومی بستگی به نوع جراحی داشته و شامل خونریزی ، تشکیل لخته ، انسداد سوند و اختلال عملکرد جنسی هستند . در اکثر موارد می توان 6 تا 8 هفته بعد از عمل - زمان مورد نیاز برای بهبود حفره پروستات - فعالیت جنسی را شروع کرد . بعد از عمل پروستاتکتومی ، هنگام انزال مایع منی وارد مثانه شده و با ادرار خارج می شود (تغییر آناتومیکی در قسمت خلفی مجرای ادرار منجر به انزال معکوس می شود)

