

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

کاوازاکی



آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن : 17-36490411

فاکس : 36490433



www.denahospital.com



شناسنامه بروشور آموزشی	
کاوازاکی	عنوان
نیما امینی	تهیه کننده
کارشناس پرستاری	سمت
تابستان 1400	سال تهیه
م. برومند (سوپروایزر ارتقاء سلامت)	ناظر کیفی
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع :

نلسون

مارلو

برونر و سودارث





توجه:

- بایستی متوجه علائم و نشانه های مسمومیت آسپرین باشید الف- وزوز کردن گوش
- ب- سردرد و سرگیجه
- 4- تحریک پذیری به صورت 2 ماه بعد از شروع علائم وجود دارد .
- 5- دو هفته پس از ترخیص جهت انجام آزمایش خون (CBC و ESR) به آزمایشگاه مراجعه کند و با جواب آزمایش به دکتر مراجعه کند .
- 6- یکماه پس از ترخیص اکو مجدد توسط پزشک متخصص قلب انجام دهد.
- 7- فعالیت کودک تا زمانی که اکو مجدد انجام می شود محدود باشد .

درمان :

درمان فعلی بیماری کاوازوکمی شامل تزریق IVIG با دوز بالا. این دارو یک فراورده خونی است که حاوی پادزهر است که برعلیه عفونت می باشد. تا زمانی که تب فروکش کند میزان بالای آسپرین ، تجویز می شود بعد از آن طی یک دوره چند هفته ای دوز آسپرین ادامه می یابد.

توجهات :

- 1- بهداشت دهان و لب
- 2- مصرف غذای نرم
- 3- ایجاد محیط آرام و بی سر و صدا

آموزش حین ترخیص :

- 1- والدین باید حداقل تا یک هفته تب کودک را کنترل و در صورت عود مراجعه کنند.
- 2- این بیماران پس از دریافت IVIG تا 11 ماه قادر به دریافت برخی واکسن ها مانند سرخک ، اوریون ، ابله مرغان نمی باشند. زیرا بدن قادر به تولید مقدار کافی آنتی بادی نخواهد بود .
- 3- کودک بایستی پس از ترخیص هر شب قرص آسپرین طبق دستور پزشک مصرف کند تا زمانی که جهت ویزیت مجدد مراجعه می کند. بهتر است قرص آسپرین به همراه شربت آنتی اسید (شربت معده) طبق دستور پزشک داده شود. محدود باشد .

بیماری کاوازوکمی :
بیماری نادری است که در آن تب طول کشیده همراه با آسیب به قلب و عروق خونی وجود دارد. علت بیماری کاوازوکمی ناشناخته است. گرچه احتمال می رود که عفونت ویروسی یا باکتریایی در پسرها شایع تر است . برای یافتن شواهد بیماری کاوازوکمی آزمایشهای خونی از کودک به عمل می آید ممکن است برای ارزیابی آسیب عضله قلبی و عروق کرونری اکوکاردیوگرافی انجام شود .
علائم :

تب طول کشیده ای که بیش از 5 روز باقی بماند، درد یا خارش و قرمزی چشمها که ممکن است با ترشحات آبکی همراه باشد.
علائم به 3 مرحله :

- 1- حاد : شروع تب بدن پاسخ به تب برها
- 2- تحت حاد : کاهش تب و سایر علائم در معرض خطر آسیب های عروق کرونری
- 3- مرحله معالجه : تمام علائم از بین رفته اما علائم آزمایشگاهی طبیعی نشده

