

اندوسکوپی - کولونوسکوپی



آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن : 36490411-17

فاکس : 36490433



تذکرات مهم:

- 1- ساعت روز با بخش اندوسکوپی بیمارستان به شماره تلفن 19-36490411 تماس بگیرید.
- 2- در صورت مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل آکسایین، آسپرین، وارفارین، پلاویکس، هپارین، دی پیریدامول، و یا استروئید حتما پزشک خود را مطلع فرمایید.
- 3- چند روز قبل از آمادگی کولونوسکوپی از خوردن انجیر، انار، انگور، خاک شیر، تخم شربتی جدا خودداری کنید.
- 4- در صورتی که بیمار دیابت داشته باشد و از داروهایی کنترل کننده آن استفاده می نماید، پرسنل اندوسکوپی را مطلع فرمایید.
- 5- بعد از انجام کولونوسکوپی، حمام نموده و لباس هایتان را بشویید.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا منصرف شدن از انجام اقدام درمانی مورد نظر، حتماً یک روز قبل طی تماس تلفنی به بخش اندوسکوپی اطلاع دهید.

شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	اندوسکوپی - کولونوسکوپی
تهیه کننده	خانم حسینی
تایید کننده	دکتر رضا فخار
بازنگری	تابستان 1400
ناظر کیفی	م. برومند (سوپروایزر ارتقاء سلامت)
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع : کتاب اصول و فنون پرستاری پوتروپری / کتاب اصول پرستاری کوزیر



برنامه پیشگیری و غربالگری سرطان روده بزرگ

بر اساس جدیدترین و معتبرترین توصیه‌ها
انجمن‌های تخصصی گوارش دنیا پیشنهاد
می‌گردد که:

- 1- تمام افراد جامعه، حتی بدون هیچ علامت
روده ای میبایست کولونوسکوپی کامل را در
سن 50 سالگی انجام دهند و در صورت نرمال
بودن نتیجه آن، هر از 10 سال تکرار شود.
- 2- افرادی که سابقه قبلی پولیپ و یا سرطان
روده بزرگ دارند، نیاز به پیگیری طبی و نظارت
مداوم دارند و می بایست با فواصل نزدیکتر
کولونوسکوپی شوند.
- 3- در صورت وجود سابقه خانوادگی مثبت (سابقه
پولیپ یا سرطان روده بزرگ در یکی از
افراد درجه یک که شامل پدر و مادر و خواهر و
برادر میباشد) شروع انجام کولونوسکوپی کامل
از سن 40 سال (و یا 5 سال زودتر از سنی که
در آن فامیل سرطان تشخیص داده شده باشد)
توصیه میگردد.

کولونوسکوپی (بررسی روده بزرگ)

- 1- ساعت 7:30 صبح روز
قبل از شروع آمادگی یک عدد آمپول
Trifluoprazine (ضد تهوع) بصورت عضلانی
تزریق گردد. در صورت ادامه حالت تهوع، یک عدد
آمپول دیگر تزریق گردد.
 - 2- از روز صبحانه ،
ناهار و شام قطع گردیده و مایعات فراوان شروع
شود.
 - 3- از ساعت تعداد عدد
قرص بیزاکودیل هر ساعت عدد
مصرف گردد.
 - 4- در ساعت 12 ظهر روز یک
شیشه سناگراف و مجدداً در ساعت 4 عصر و 8 شب
همان روز 2 شیشه سناگراف دیگر درون یک پارچ
آب میوه یا شربت ریخته شود، در فاصله یک ساعت
میل گردد.
 - 5- از ساعت مایعات فراوان
شامل (آب- آب میوه، آب کمپوت، عرقیات، چای و
شربت آلات) مرتباً خورده و مایعات همچنان تا روز
..... ادامه داده شود.
 - 6- لطفاً ناحیه اطراف مقعد تراشیده شود.
 - 7- در مدت آمادگی حداقل 50 لیوان آب و مایعات
مصرف گردد.
- لازم به ذکر است از نوشیدن شیر - آب هویج -
آب هندوانه - آب سیب - شربت فیمتو - آب آلبالو -
آب انار خودداری گردد.

اندوسکوپی (بررسی مری، معده، اثنی عشر)

بیماران محترم خواهشمند است به نکات زیر توجه
فرمایید.

- 1- قبل از ساعت 6 بعداز ظهر.....
شام سبک میل کرده و دیگر چیزی نخورید.
 - 2- در صورت تشنگی تا ساعت 12
شب..... آب یا چای به
مقدار کم نوشیده شود.
 - 3- پس از انجام اندوسکوپی و شستشوی دهان
کمی آب یا آب میوه می توانید میل نمایید.
- بیمار محترم خانم / آقای.....**
- لطفاً برای انجام اندوسکوپی - ایلئوکولونوسکوپی
ساعت روز به
بیمارستان دنا - طبقه دوم - بخش اندوسکوپی
مراجعه فرمایید.
- از بیماران محترم تقاضا می شود :**
- 1- در هنگام مراجعه از به همراه داشتن زیورآلات -
عینک - دندان مصنوعی خودداری نمایید.
 - 2- بعلت تزریق مسکن به بیماران ، حتماً بایستی
دو نفر همراه داشته باشید
 - 3- در صورت داشتن سابقه بیماری قلبی و استفاده
از داروهای مربوطه ، لطفاً داروهای خود را به
همراه داشته باشید.
 - 4- در صورت داشتن جواب آزمایش سونوگرافی یا
سی تی اسکن آن را همراه داشته باشید.
 - 5- در صورت داشتن دفترچه بیمه، لطفاً همراه داشته
باشید